

Dr. med. Stefan Bilger
Facharzt für Allgemeinmedizin - Umweltmedizin
Handschuhsheimer Landstr. 11, 69221 Dossenheim
Telefon 06221 - 86 95 75
Telefax 06221 - 86 41 03

Information zur Gelbfieber-Impfung

Die Gelbfieber-Impfung darf von uns als staatlich autorisierter Gelbfieber-Impfstelle durchgeführt und bescheinigt werden.

Bitte beachten Sie dabei folgendes:

Der Impfstoff (Stamril®) wirkt sehr zuverlässig. **Der Impfschutz beginnt 10 Tage nach der Impfung und hält mindestens 10 Jahre an.**

Nicht geimpft werden darf / dürfen

- bei akuten Erkrankungen (Infekten mit Fieber)
- bei Immundefekten und immunsuppressiver Therapie
- bei Allergie gegen Hühnereiweiß
- Kinder unter 6 Monaten.

Während der Schwangerschaft kann geimpft werden (in den ersten 12 Wochen sollte die Impfung nur ausnahmsweise erfolgen).

Nebenwirkungen:

- gelegentlich (in ca. 10 %) leichte Lokalreaktionen an der Impfstelle
- nach 4 – 6 Tagen leichte Allgemeinreaktion (Abgeschlagenheit, Muskelschmerzen, Temperaturerhöhung)
- Alkoholgenuss ist für etwa eine Woche nach der Impfung zu vermeiden!

Zeitabstände beachten bei anderen Impfungen mit Lebendimpfstoffen (Masern-Mumps-Röteln, Typhus-Schluckimpfung!)

Kosten: 20 € (ärztliche Leistung), ca. 20 € (Impfstoff).

Dr. med. Stefan Bilger
Facharzt für Allgemeinmedizin - Umweltmedizin
Handschuhsheimer Landstr. 11, 69221 Dossenheim
Telefon 06221 - 86 95 75
Telefax 06221 - 86 41 03

Information zur Gelbfieber-Impfung

Die Gelbfieber-Impfung darf von uns als staatlich autorisierter Gelbfieber-Impfstelle durchgeführt und bescheinigt werden.

Bitte beachten Sie dabei folgendes:

Der Impfstoff (Stamril®) wirkt sehr zuverlässig. **Der Impfschutz beginnt 10 Tage nach der Impfung und hält mindestens 10 Jahre an.**

Nicht geimpft werden darf / dürfen

- bei akuten Erkrankungen (Infekten mit Fieber)
- bei Immundefekten und immunsuppressiver Therapie
- bei Allergie gegen Hühnereiweiß
- Kinder unter 6 Monaten.

Während der Schwangerschaft kann geimpft werden (in den ersten 12 Wochen sollte die Impfung nur ausnahmsweise erfolgen).

Nebenwirkungen:

- gelegentlich (in ca. 10 %) leichte Lokalreaktionen an der Impfstelle
- nach 4 – 6 Tagen leichte Allgemeinreaktion (Abgeschlagenheit, Muskelschmerzen, Temperaturerhöhung)
- Alkoholgenuss ist für etwa eine Woche nach der Impfung zu vermeiden!

Zeitabstände beachten bei anderen Impfungen mit Lebendimpfstoffen (Masern-Mumps-Röteln, Typhus-Schluckimpfung!)

Kosten: 20 € (ärztliche Leistung), ca. 20 € (Impfstoff).